

المجال التعليمي 01: آليات التنظيم على مستوى العضوية.  
الوحدة التعليمية 01: التحكم العصبي.  
النشاط 01: دور المنعكس العضلي في الحفاظ على  
وضعية الجسم.

الكفاءة المرحلية: اقتراح حلول عقلانية مبنية على أسس علمية من أجل المحافظة على الصحة  
على ضوء المعلومات المتعلقة بدور كل من النظام العصبي و الهرموني في التنظيم الوظيفي  
للعضوية.

الهدف التعليمي: يحدد دور النظام العصبي في التنظيم الوظيفي للعضوية.  
الكفاءة المستهدفة: إظهار دور المنعكس العضلي في الحفاظ على توازن الجسم.

1 حصص مباشرة

2 حصص مسجلة

3 دورات مكثفة

أحصل على بطاقة الإشتراك



- كيف يتم الحفاظ على توازن وضعية الجسم؟

التعليمة: ما هي المشكلة العلمية المطروحة من خلال النتائج المتوصل إليها سابقاً؟

تحديد  
المشكلة


- يتم الحفاظ على توازن وضعية الجسم عن طريق تقلص عضلات واسترخاء اخرى.  
- يتم الحفاظ على توازن وضعية الجسم بتدخل العظام والمفاصل.

التعليمة: اقترح فرضيات تجيب على المشكل المطروح سابقاً.  
الإصغاء لمقترحات التلاميذ و مساعدتهم على التفكير.

صياغة  
الفرضيات

التقصي

1- إظهار دور المنعكسات العضلية في توازن وضعية الجسم:  
- تمثل الوثيقة (3) ص 10 وضعيات مختلفة للضفدع أثناء القيام بحركات منسقة.



التعليمة: باستغلال معطيات الوثيقة 1 صادق على صحة احدى الفرضيات المقترحة سابقاً.

1 حصص مباشرة

2 حصص مسجلة

3 دورات مكثفة

أحصل على بطاقة الإشتراك





### - المصادقة على صحة الفرضيات المقترحة سابقا:

- استغلال الوثيقة (3) ص 10: تمثل الوثيقة صور للضفدع في وضعيات مختلفة حيث نلاحظ أن هناك عدة عناصر تتدخل في هذه الوضعيات هي عضلات متضادة (قابضة وباسطة) وعظام متحركة على مستوى مفصل تثبت عليها هذه العضلات مراقبة بذلك وضعية العظام وذلك حسب حالتها المتقلصة أو المسترخية.  
- الاستنتاج: يتطلب الحفاظ على توازن وضعية الجسم تدخل مجموعة من المنعكسات العضلية التي تعتمد أساسا على عمل العضلات المتضادة والتي تسمح بالحفاظ على زاوية معينة للمفاصل وبالتالي تثبيتها في وضعية معينة.  
- ومنه: الفرضية (يتم الحفاظ على توازن وضعية الجسم عن طريق تقلص عضلات واسترخاء اخرى) هي الفرضية الصحيحة.

### (2)- مفهوم المنعكس العضلي:

#### (أ)- دراسة الوثيقة 4 ص 11 (منعكس عضلي رضفي):



التعليمة: فسر النتيجة المسجلة في الوثيقة.




### أ- دراسة الوثيقة 4 ص 11 (منعكس عضلي رضفي):

- تفسير نتائج الوثيقة: تمثل الوثيقة استثارة منعكس رضفي حيث عند الضرب بالمطرقة المطاطية ضربة خاطفة تحت الركبة (عظمة الرضفة) نلاحظ تحرك الرجل فجائيا نحو الأعلى و لكن سرعان ما تعود إلى وضعيتها الأصلية، و نفس ذلك بتقلص العضلة الباسطة للساق ثم استرخائها.

### ب- دراسة الوثيقة (7) ص 12:

نعزل عضلة ساقية لضفدع مع الحفاظ على الاتصالات العصبية (ليف عصبي حسي، ليف عصبي حركي) ثم نعلقها من وترها العلوي في حامل ونربط وترها السفلي بنقل (ث)، ونقوم بقياس طول العضلة وبتسجيل تواتر كمونات العمل في الليف العصبي الحسي المتصل بها. النتائج التجريبية موضحة في الوثيقة التالية.



التعليمة 1: حلل النتائج الممثلة في الوثيقة.

التعليمة 2: من خلال ما سبق (الوثيقتين 4 و 7)، استنتج مفهوم المنعكس العضلي.

1 حصص مباشرة

2 حصص مسجلة

3 دورات مكثفة

أحصل على بطاقة الإشتراك



### ب)- دراسة الوثيقة (7) ص 12:

- تحليل النتائج التجريبية: تمثل الوثيقة تركيب تجريبي لقياس طول العضلة وتواتر الليف العصبي الحسي في وجود وفي غياب الثقل حيث نلاحظ:

- في المرحلة 1: تكون العضلة مسترخية طولها ثابت وتواتر كمونات العمل في الليف العصبي الحسي المتصل بها ضعيف.
  - في المرحلة 2: بعد اضافة الثقل نلاحظ زيادة في طول العضلة مع زيادة في تواتر كمونات العمل في الليف العصبي الحسي المتصل بها.
  - في المرحلة 3: مقاومة العضلة للتمدد وعودة طولها وتواتر كمونات العمل في الليف العصبي الحسي المتصل بها إلى حالتها الاصلية.
- نتيجة: يؤدي تمدد العضلة إلى تمدد المغازل العصبية الحسية فينتج عن ذلك تغير في تواتر كمونات العمل المكونة للرسالة العصبية.
- استنتاج مفهوم للمنعكس العضلي: هو رد فعل لاإرادي يتمثل في تقلص العضلة استجابة لتنبيهها (تمدها، شدها).

ملف الحصص المباشرة و المسجلة

1 حصص مباشرة

2 حصص مسجلة



3 دورات مكثفة

أحصل على بطاقة الإشتراك



3- إظهار مميزات العضلات الهيكلية للجسم:

تمثل الوثيقة التالية حالات العضلات الهيكلية أثناء نشاط عضلي.



التعليمة: استخراج مميزات العضلات الهيكلية وبين كيفية التمييز بين العضلات الباسطة والقابضة للجسم مع تحديدها.

- العضلات الهيكلية هي كل عضلة مخططة مثبتة عن طريق الأوتار لقطعة من العظام الطويلة، حيث يفصل بين القطع العظمية مفاصل تسمح بالحركة إثر تقلص العضلات الهيكلية.
- نميز بين العضلتين القابضة والباسطة من خلال حالة الطرف بعد تقلص العضلة بحيث:
  - \*- إذا أدى تقلص العضلة إلى قبض (ثني) الطرف تدعى بالعضلة القابضة.
  - \*- إذا أدى تقلص العضلة إلى بسط الطرف تدعى بالعضلة الباسطة.

### - تحديد العضلات الباسطة و القابضة:

- \*- العضلة الباسطة للقدم هي العضلة الخلفية للساق.
- \*- العضلة الباسطة للساق هي العضلة الأمامية للفخذ.
- \*- العضلة الباسطة للساعد هي العضلة الخلفية للعضد.

1 حصص مباشرة

2 حصص مسجلة


3 دورات مكثفة

أحصل على بطاقة الإشتراك



#### 4- الاستجابة المتزامنة للعضلات المتضادة:

تجربة: نضع إكترودات مستقبلة (متصلة بجهاز حاسوب) على الجلد الذي يغطي كل من العضلة القابضة والعضلة الباسطة في ساق شخص ونطلب منه أن يقوم بثني وبسط قدمه. النتائج مبينة في الوثيقة (8) ص 13:



**التعليمة: باستغلالك للوثيقة بين أن العضلتين القابضة والباسطة تعملان بالتضاد.**

- تبيان ان العضلات الباسطة و القابضة تعمل بالتضاد:
- من خلال الوثيقة (8) ص 13 التي تمثل تسجيلات لتغيرات تواتر كمونات العمل في العضلتين المتضادتين للساق بدلالة الزمن عند ثني وبسط القدم حيث نلاحظ:
- ظهور كمونات العمل يكون بالتناوب بين النوعين من العضلات، حيث يرتفع تواتر كمونات العمل في العضلة الباسطة (خلال بسط القدم) يقابله عدم تسجيل كمون عمل في العضلة القابضة (حالة استرخاء)، والعكس صحيح عند ثني القدم.
- و منه يتبين أنه: في المنعكس العضلي يكون عمل العضلات المتضادة منظم ومنسق وبشكل متعاكس حيث يصاحب تقلص العضلة المنبهاة استرخاء العضلة المضادة لها.






## الخلاصة

- يتطلب الحفاظ على وضعية الجسم تعديل لاإرادي مستمر لحالة العضلات القابضة والباسطة (منعكسات عضلية).
- المنعكس العضلي هو رد فعل لا إرادي يتمثل في تقلص العضلة استجابة لتمددتها، يصاحب تقلص عضلة استرخاء العضلة المضادة لها.
- يقصد بالعضلات الهيكلية كل عضلة مخططة مثبتة عن طريق الأوتار لقطعة من العظام الطويلة، حيث يفصل بين القطع العظمية مفاصل تسمح بالحركة إثر تقلص العضلات الهيكلية.

## التقويم

- قطع العالم شرينغتون النخاع الشوكي لقطعة في مؤخرة الدماغ، ثم نبتة الطرف الخلفي للحيوان (بالوخز مثلاً)، فلاحظ إنثناء الطرف، أي حدوث منعكس نخاعي. بعد ذلك قام بتسجيل تغيرات التوتر الألي للعضلتين المتضادتين للعضلة القابضة و العضلة الباسطة للساق) إثر نفس التنبيه. النتائج مبينة في الوثيقة (9) ص 13.



التعليمة: بين باستغلال نتائج تجربة شرينغتون خصائص العضلات القابضة والباسطة.

1 حصص مباشرة

2 حصص مسجلة

3 دورات مكثفة


أحصل على بطاقة الإشتراك



- ف 1: مستقبل حسي، ليف عصبي حسي و الدماغ.
- ف 2: مستقبل حسي، ناقل حسي، مركز عصبي، ناقل حركي والعضلة

## التقصي

1- العناصر التشريحية المتدخلة في المنعكس العضلي:  
- تمثل الوثيقة التالية مخطط للقوس الانعكاسية للمنعكس العضلي.



التعلیمة: باستغلال معلوماتك المكتسبة في السنة الرابع متوسط، أكمل مخطط الوثيقة  
موضحا فيه العناصر التشريحية المتدخلة في المنعكس العضلي.






## (2)- الاتصالات العصبية العضلية:


تمثل الوثيقتين (1) و (2) ص 14 صور بالمجهر الضوئي مع رسوماتها التخطيطية لمقطع نسيجي في عضلة يظهر نمطين من الاتصالات العصبية العضلية بحيث:

- الوثيقة (1): تمثل صورة بالمجهر الضوئي لمغزل عصبي عضلي ورسم تخطيطي له.

- الوثيقة (2): تمثل صورة بالمجهر الضوئي للوحة محرّكة ورسم تخطيطي لها.



الوثيقة (2)



مغزل عصبي عضلي كما يبدو تحت المجهر الضوئي. رسم تخطيطي لمغزل عصبي عضلي.

الوثيقة (1)

**التعليمة: باستغلال معطيات الوثيقتين (1) و (2)، اشرح كيف تلعب العضلة دور مزدوج في حالة المنعكس العضلي.**

1 حصص مباشرة

2 حصص مسجلة

3 دورات مكثفة

أحصل على بطاقة الإشتراك



- شرح كيف تلعب العضلة دور مزدوج خلال المنعكس العضلي:

يعرف باللوحة المحركة (اتصال من نوع حركي).

- استغلال الوثيقة (1) ص 14: تمثل الوثيقة صورة بالمجهر الضوئي

لمغزل عصبي عضلي ورسم تخطيطي له حيث نلاحظ ألياف عضلية

العصبون الحركي إلى العضلة.

خاصة (حساسة لتمدد العضلة) متواجدة في مركز العضلة تلتف حولها - و منه:

نهايات عصبية لألياف عصبية حسية مشكلة تراكيب مغزلية تدعى

المغزل العصبي العضلي (اتصال من نوع حسي).

المزدوج من خلال إحتوائها على

\* مغزل عصبي عضلي الذي يلعب دور مستقبل حسي.

- استنتاج: يتمثل دور المغزل العصبي الحسي في تحسسه لتمدد

العضلة إثر تنبيهها فتتولد سيالة عصبية حسية على مستواه.

\* اللوحة المحركة التي تسمح للعضلة بالقيام بدور المنفذ الحركي.

- استغلال الوثيقة (2) ص 14: تمثل الوثيقة صورة بالمجهر الضوئي

للوحة محركة ورسم تخطيطي لها حيث نلاحظ ارتباط ألياف عضلية

عادية تقلصية بنهايات عصبية لعصبونات حركية، يشكل المجموع ما

### 3- المركز العصبي للمنعكس العضلي (النخاع الشوكي):

أ- **معطيات طبية:** يمكن للمنعكس الأخيلي أن يختفي نتيجة حادث بسبب خلل أو قطع في النخاع الشوكي أو ضغط العصب الوركي الذي يصل بين النخاع الشوكي وعضلة ربة الساق.

**التعليمة: ما هي المعلومة المستخلصة من المعطيات الطبية؟**

دروسكم

منصة التعليم الإلكتروني



ملف الحصة المباشرة و المسجلة

1 حصص مباشرة

1

2 حصص مسجلة

2

3 دورات مكثفة

3


أحصل على بطاقة الإشتراك



(أ) - **معطيات طبية:** يمكن للمنعكس الأخيلي أن يختفي نتيجة حادث بسبب خلل أو قطع في النخاع الشوكي أو ضغط العصب الوركي الذي يصل بين النخاع الشوكي وعضلة ريلة الساق.  
- المعلومة المستخلصة: النخاع الشوكي هو المركز العصبي المسؤول عن المنعكسات العضلية وعن الحفاظ على وضعية الجسم.

### (ب) - بنية النخاع الشوكي:

تمثل الوثيقة التالية رسم تخطيطي لمقطع على مستوى النخاع الشوكي.



**التعليمة: صف بنية النخاع الشوكي.**

1 حصص مباشرة

2 حصص مسجلة

3 دورات مكثفة

أحصل على بطاقة الإشتراك



(ب)- وصف بنية النخاع الشوكي: عند الفحص المجهرى لمقطع عرضي للنخاع الشوكي نلاحظ أنه يتكون من مادتين محاطة بأغشية تدعى السحايا:

- المادة الرمادية: مركزية لها شكل حرف H (نهايتان أماميتان واسعتان هما القرنان الأماميان أو البطنيان، و نهايتان خلفيتان ضيقتان هما القرنان الخلفيان أو الظهران)، تتكون المادة الرمادية من أشكال نجمية عبارة عن أجسام خلوية.

- المادة البيضاء: محيطية ، تتكون من ألياف عصبية أغلبها محاطة بغمد النخاعين.

يتصل بالنخاع الشوكي عصبان شوكيان، لكل عصب جذران، جذر أمامي رقيق و جذر خلفي به انتفاخ يدعى العقدة الشوكية، تحتوي هذه الأخيرة على أجسام خلوية.

1 حصص مباشرة





2 حصص مسجلة

3 دورات مكثفة

أحصل على بطاقة الإشتراك



4- الطرق الحسية و الحركية (دراسة الوثيقة 4 ص 14):  
أجرى العلمان بال و ماجندي تجارب على كلاب صغيرة، عمرها 6 أسابيع حيث  
النخاع الشوكي و الدماغ سليمان. الشروط و النتائج التجريبية ممثلة في الوثيقة (4)  
ص 14.

الملاحظات	تجارب بال و ماجندي
شلل و فقدان الاحساس في المناطق التي يعصبها هذا العصب.	1- قطع عصب شوكي 
- قطع: - شلل العضلات الموافقة. - عدم فقدان الاحساس. - التنبهات الكهربائية: - في (أ): تقلص عضلي. - في (ب): لا شيء.	2- قطع الجذر الأمامي 
- قطع: فقدان الاحساس في المناطق التي يعصبها العصب و عدم حدوث شلل - التنبهات الكهربائية: - في (أ): لا شيء. - في (ب): يحس الألم خفيف.	3- قطع الجذر الخلفي 
	

التعليمة: ما هي المعلومات المستخلصة من النتائج التجريبية.

1 حصص مباشرة

2 حصص مسجلة

3 دورات مكثفة

أحصل على بطاقة الإشتراك





## - المعلومات المستخلصة من نتائج تجارب بال و ماجندي:

- يحتوي العصب الشوكي على ألياف عصبية حسية وألياف عصبية حركية فهو عصب مختلط.

- يحتوي الجذر الأمامي للنخاع الشوكي على ألياف عصبية حركية.

- تنتقل السيالة العصبية الحركية في الاتجاه النابذ (من المركز إلى المحيط).

- يحتوي الجذر الخلفي للنخاع الشوكي على ألياف عصبية حسية.

- تنتقل السيالة العصبية الحسية في الاتجاه الجاذب (من المحيط إلى المركز).

1 حصص مباشرة

1

2 حصص مسجلة

2

3 دورات مكثفة

3

أحصل على بطاقة الإشتراك



يتطلب حدوث المنعكس العضلي تدخل البنيات التالية المتمثلة في:

- مستقبل حسّي: المغزل العصبي العضلي الذي يتواجد في مركز العضلة ويتشكل من ألياف عضلية حساسة لتمدد العضلة والمرتبطة مع الألياف العصبية الحسية.
- ناقل حسّي: الألياف العصبية الحسية للعصب الشوكي.
- مركز عصبي: النخاع الشوكي.
- ناقل حركي: الألياف العصبية الحركية للعصب الشوكي.
- أعضاء منفذة: العضلات الباسطة والقابضة.

### الخلاصة

1 حصص مباشرة

1

2 حصص مسجلة

2

3 دورات مكثفة

3

أحصل على بطاقة الإشتراك



التعليمية: لخص آلية انتقال السيالة العصبية أثناء المنعكس العضلي مدعماً اجابتك  
برسم تخطيطي..

التقويم

دروسكم  
منصة التعليم الإلكتروني

ملف الحصة المباشرة و المسجلة

1 حصص مباشرة

2 حصص مسجلة

3 دورات مكثفة

أحصل على بطاقة الإشتراك



1 حصص مباشرة


2 حصص مسجلة

3 دورات مكثفة

أحصل على بطاقة الإشتراك



**آلية انتقال السيالة العصبية أثناء المنعكس العضلي:** عند إحداث تنبيه فعال على مستوى عضلة ما، تنبه المغزل العصبي الحسي فتتولد سيالة عصبية حسية تنتقل عبر ألياف عصبية حسية (عصبون حسي) في الاتجاه الجاوذ نحو النخاع الشوكي الذي يترجمها إلى سيالة عصبية حركية تنتقل عبر ألياف عصبية حركية (عصبونات حركية) في الاتجاه النابذ نحو العضلة المنبهاة (اللوحة المحركة) فتستجيب هذه الأخيرة بالتقلص (يقل طولها و يزداد سمكها).



## النشاط 03: آلية نقل الرسالة العصبية على مستوى

المشبك.

وضعية

الانطلاق:

اشرح كيف يتم المحافظة على توازن وضعية الجسم.

دروسكم

منصة التعليم الإلكتروني

ملف الحصة المباشرة و المسجلة

1 حصص مباشرة

2 حصص مسجلة

3 دورات مكثفة

أحصل على بطاقة الإشتراك



يتم الحفاظ على توازن وضعية الجسم بفضل تدخل المنعكسات العضلية التي تلعب العضلات الهيكلية المتضادة دورا هاما فيها باعتبارها عضوا مستقبلا للتنبيه بفضل المغازل العصبية العضلية ومنفذا في نفس الوقت (التقلص) بفضل اللوحات المحركة. كما يكون عمل العضلات المتضادة منظم ومنسق وبشكل متعاكس حيث يصاحب تقلص عضلة استرخاء العضلة المضادة لها.

**ما هي المشكلة العلمية المطروحة من خلال النتائج المتوصل إليها سابقا؟**

دروسكم  
منصة التعليم الإلكتروني

ملف الحصة المباشرة و المسجلة

1 حصص مباشرة

2 حصص مسجلة

3 دورات مكثفة

أحصل على بطاقة الإشتراك



- كيف يتم التنسيق بين عمل العضلات المتعاكسة (المتضادة)؟

اقترح فرضيات تجيب على المشكل المطروح سابقا.

دروسكم

منصة التعليم الإلكتروني

ملف الحصة المباشرة و المسجلة

1 حصص مباشرة

2 حصص مسجلة

3 دورات مكثفة

أحصل على بطاقة الإشتراك




- **ف1:** بفضل وجود منطقة إتصال (مشبك) تسمح بإنتقال الرسالة العصبية من العصبون الحسي للعضلة إلى العصبون الحركي لها وأخرى تمنع مرور الرسالة العصبية من العصبون الحسي للعضلة إلى العصبون الحركي للعضلة المضادة لها.

- **ف2:** بفضل النخاع الشوكي.

### 1- إظهار وجود نقل مشبكي و نمطه ( دراسة الوثيقة (3) ص 21):

- لدراسة انتقال السيالة العصبية ضمن سلسلة عصبونية نختار عصبونين من نفس النوع ومتماثلين تشريحيًا مغمدين أو غير مغمدين) ونحقق التركيب التجريبي الموضح في الوثيقة (3) ص 21.



**التعليمة: بإستغلال معطيات الوثيقة، بين وجود نقل مشبكي و نمطه.**





1 حصص مباشرة

2 حصص مسجلة

3 دورات مكثفة

أحصل على بطاقة الإشتراك



**استغلال الوثيقة (3) ص 21:** تمثل الوثيقة التسجيلات المتحصل عليها إثر التنبيه الفعال للمحور قبل مشبكي بحيث المنحنيين 1 و 2 يمثلان كمون عمل حيث نلاحظ أنهما متماثلين لهما نفس السعة لكن المنحني 2 المسجل على مستوى المحور بعد المشبكي سجل تأخر زمني مقداره 1.5 ميلي/ ثانية مقارنة مع المنحني 1 المسجل على مستوى المحور قبل المشبكي، رغم أن المسافة بين (ت1 - ق1) هي نفسها بين (ت2 - ق2)، دليل على أن وجود المشبك يسمح بنقل الرسالة العصبية من خلية قبل مشبكية إلى خلية بعد مشبكية لكن بسرعة أقل مقارنة بسرعة انتقالها في الليف العصبي وهذا ما يدعى بالتأخر المشبكي أي أن آلية انتقال السيالة العصبية عبر المشبك تختلف عن آلية انتقالها على طول الألياف العصبية.

- و منه يتبين أن: السيالة العصبية تنتقل من عصبون إلى آخر ببطء عبر المشبك وتسمى هذه الظاهرة بالتأخر المشبكي.

## (2)- آلية النقل المشبكي:

### (أ)- تعريف المشابك و أنواعه ( دراسة الوثيقتين 4 و 5 ص 21):



### بنية المشبك العصبي - العصبي كما يبدو بالمجهر الإلكتروني النافذ و رسمه التفسيري



### بنية المشبك العصبي - العضلي كما يبدو بالمجهر الإلكتروني النافذ و رسمه التفسيري

**التعليمة: من خلال الوثيقتين، استنتج تعريفاً للمشبك مبرزاً أنواعه.**

حصص مباشرة

1

حصص مسجلة

2

دورات مكثفة

3

أحصل على بطاقة الإشتراك



1 حصص مباشرة

2 حصص مسجلة

3 دورات مكثفة

أحصل على بطاقة الإشتراك



أ- تعريف المشابك و أنواعه ( دراسة الوثيقتين 4 و 5 ص 21):

- استنتاج تعريف المشبك: هو منطقة اتصال (تمفصل) بين عصبونين أو بين عصبون وعضلة، حيث يتكون من وحدة قبل مشبكية بها حويصلات عديدة تدعى بالحويصلات المشبكية و وحدة بعد مشبكية يفصل بينهما فراغ يدعى شق مشبكي.

- أنواع المشابك:

\*- مشبك عصبي - عصبي: يصل بين النهاية المحورية للعصبون قبل مشبكي يحتوي على حويصلات مشبكية مع عصبون آخر بعد مشبكي.  
\*- مشبك عصبي - عضلي: يصل بين النهاية المحورية للعصبون الحركي قبل المشبكي يحتوي على حويصلات مشبكية مع خلية عضلية (ليف عضلي)، يتواجد على مستوى العضلات (اللوحة المحركة).

1 حصص مباشرة

2 حصص مسجلة


3 دورات مكثفة

أحصل على بطاقة الإشتراك



ب)- دور المشبك في تحديد اتجاه انتقال الرسالة العصبية (دراسة الوثيقة 8 ص 19):

تمثل الوثيقة إظهار اتجاه الرسالة العصبية في نفس الليف (على اليمين) وعبر سلسلة من العصبونات (على اليسار).



التعليمة: حل النتائج المسجلة في الوثيقة.

1 حصص مباشرة

2 حصص مسجلة

3 دورات مكثفة

أحصل على بطاقة الإشتراك



1 حصص مباشرة

2 حصص مسجلة

3 دورات مكثفة

أحصل على بطاقة الإشتراك



## ب)- دور المشبك في تحديد اتجاه انتقال الرسالة العصبية:

- تحليل نتائج الوثيقة (8) ص 19:

- على مستوى ليف عصبي واحد: عند إحداث تنبيه في نقطة من المحور الأسطواناني لاحظنا تسجيل كمون عمل على جانبي النقطة المنبهاة دليل على انتشار الرسالة العصبية في اتجاهين متعاكسين.

- الاستنتاج: على مستوى الليف العصبي الواحد، يمكن للسيالة العصبية أن تنتقل في اتجاهين متعاكسين.


- ضمن سلسلة عصبونية: عند تنبيه عصبون (ب) في سلسلة عصبونية نلاحظ تسجيل كمونات عمل على مستوى نفس العصبون (ب) والذي يليه في السلسلة (ج) دليل على مرور السيالة العصبية بينما لم يسجل كمون عمل (تسجيل كمون راحة) في العصبون الذي قبله (أ) دليل على عدم مرور السيالة العصبية.

- الاستنتاج: تنتقل الرسالة العصبية من عصبون إلى آخر أو من عصبون إلى خلية منفذة في اتجاه واحد (من خلية قبل مشبكية إلى خلية بعد مشبكية).


## ج- تحليل نتائج حقن مستخلص الحويصلات المشبكية في الشق المشبكي (دراسة الوثيقة 8 ص 19):

النتائج	التجربة	الوسط
	تنبيه المحور المحرك.	ماء البحر
	وضع قطرة من محتوى الحويصلات المشبكية في الشق المشبكي.	
	وضع قطرة من الأستيل كولين على مستوى الشق المشبكي في وجود مادة تمنع تفكك الأستيل كولين (الإيزرين).	
	حقن الأستيل كولين داخل الليف العضلي.	

تجربة: نجري سلسلة من التجارب على مستوى اللوحة المحركة، التركيب التجريبي، الشروط و النتائج التجريبية المحصل عليها مبينة في الوثيقة التالية.



التعليمة: حلل النتائج التجريبية الممثلة في الوثيقة



ملف الحصة المباشرة و المسجلة



- 1 حصص مباشرة
- 2 حصص مسجلة
- 3 دورات مكثفة

أحصل على بطاقة الإشتراك





### ج- تحليل نتائج حقن مستخلص الحويصلات المشبكية في الشق المشبكي:

- تحليل النتائج التجريبية المسجلة في جدول الوثيقة (8) ص 19:

\*- عند تنبيه المحور المحرك (قبل المشبكي) لاحظنا تسجيل كمون عمل على مستوى الليف العصبي م1 (خلية قبل مشبكية)، ثم تسجيل كمون عمل على مستوى الليف العضلي م2 (خلية بعد مشبكية) دليل على انتقال السيالة العصبية عبر المشبك.

\*- عند وضع قطرة من محتوى الحويصلات المشبكية في الشق المشبكي لاحظنا تسجيل كمون عمل في م2 فقط مما يدل على أن الحويصلات المشبكية تحتوي على مادة تعمل على توليد سيالة عصبية بعد مشبكية فقط (بدون تنبيه).

\*- عند وضع قطرة من الأستيل كولين على مستوى الشق المشبكي في وجود مادة تمنع تفكك الأستيل كولين (الإزيرين) لاحظنا تسجيل

4 كمونات عمل على مستوى الليف العضلي م2 أي أن الأستيل كولين قد حفز على توليد رسالة عصبية بعد مشبكية مما يدل على أن المادة الموجودة في الحويصلات المشبكية هي الأستيل كولين، كما أن عملها مؤقت.

\*- عند حقن الأستيل كولين داخل الليف العضلي لاحظنا عدم تسجيل كمون راحة في م2 أي عدم تولد رسالة عصبية مما يدل على أن الأستيل كولين لا يؤثر داخل (هيولى) الخلية بعد المشبكي.

- استنتاج: تنتقل الرسالة العصبية عبر المشبك بواسطة مواد كيميائية (وسيط أو مبلغ كيميائي) موجود في الحويصلات المشبكية مثل الأستيل كولين حيث تؤثر على السطح الخارجي لغشاء الخلية بعد المشبكية.

- معلومة هامة: يؤثر الوسيط الكيميائي المفرز من طرف النهاية المحورية للخلية قبل المشبكية على غشاء الخلية بعد المشبكية لاحتوائه على مستقبلات نوعية لهذا الوسيط.



1 حصص مباشرة

2 حصص مسجلة


3 دورات مكثفة

أحصل على بطاقة الإشتراك



(د) - تبيان نمط تشفير الرسالة العصبية على مستوى المشبك:

تجربة: في مشبك عصبي-عصبي نضع جهازين لرسم الذبذبات المهبطية يسجل فرق الكمون في الليف العصبي القبل مشبكي، وجهاز (ب) يسجل في الليف العصبي البعد مشبكي ثم نلاحظ التسجيلات المتحصل عليها ثم بعد إحداث تنبيهات متزايدة الشدة كما نلاحظ الصور التي تبين للمشبك (عدد الحويصلات المشبكية) في كل حالة. التركيب التجريبي في الوثيقة (9) ص 20.



التعليمة: باستغلال معطيات الوثيقة، بين نمط تشفير الرسالة العصبية على مستوى المشبك.

كمون الليف العصبي  
مركب  
كمون الليف العصبي  
زوايا الانتقال  
كمون بعد مشبكي

1 حصص مباشرة

2 حصص مسجلة

3 دورات مكثفة

أحصل على بطاقة الإشتراك



### د- تبيان نمط تشفير الرسالة العصبية على مستوى المشبك:

استغلال الوثيقة (9) ص 20:

**المرحلة 1:** في حالة راحة أي في غياب تنبيه الليف العصبي قبل المشبكي نلاحظ تسجيل كمون راحة في كل من الليف العصبي قبل المشبكي و العصبون بعد المشبكي، كما نلاحظ على مستوى المشبك وجود حويصلات مشبكية عديدة في النهاية العصبية قبل مشبكية.

**المرحلة 2:** عند تنبيه الليف العصبي قبل المشبكي بتنبيه فعال ضعيف الشدة نسجل تواتر ضعيف لكمونات العمل (2) في الغشاء قبل

المشبكي ونسجل كمون بعد مشبكي تنبیهي (PPSE) ضعيف السعة في الغشاء بعد المشبكي، كما نلاحظ على مستوى المشبك تناقص ضئيل لعدد الحويصلات المشبكية وظهور بعض التعرجات في الغشاء قبل المشبكي دليل على حدوث إفراز قليل لمحتوى الحويصلات المشبكية (الوسيط الكيميائي العصبي) في الشق المشبكي.



**المرحلة 3:** عند تنبيه الليف العصبي قبل المشبكي بتنبيه قوي الشدة نلاحظ تسجيل تواتر كبير لكمونات العمل في الغشاء قبل المشبكي (5) و نسجل كمون بعد مشبكي (PPSE) أكبر سعة في الغشاء بعد المشبكي، كما نلاحظ على مستوى المشبك تناقص معتبر لعدد الحويصلات المشبكية وظهور العديد من التعرجات في الغشاء قبل المشبكي دليل على حدوث إفراز كبير للوسيط الكيميائي العصبي في الشق المشبكي.

- الاستنتاج: يوجد تناسب طردي بين تواتر كمونات العمل في العصبون قبل المشبكي و كمية الوسيط الكيميائي العصبي المفترزة في الشق المشبكي و سعة الكمون بعد المشبكي.

و منه:

على مستوى المشبك، تتحول الرسالة العصبية المشفرة بتواترات كمونات العمل في العصبون قبل المشبكي، إلى رسالة مسفرة بتركيز الوسيط الكيميائي العصبي المفترز في الشق المشبكي.

3- تنسيق عمل العضلات المتضادة (دراسة الوثيقة 1 من الملحق):  
تجربة: نمّذ عضلة الفخذ (العضلة الباسطة للساق) بدرجات مختلفة (منعكس رضفي)، ثم نقوم بتسجيل نشاط العصبونات المحركة التي تتحكم في تقلص العضلات القابضة و الباسطة للساق. النتائج ممثلة في الوثيقة التالية:



التعليمة: قارن نشاط العصبونات المحركة للعضلة القابضة والعضلة الباسطة مبرزا دور العصبون الجامع.



ملف الحصة المباشرة و المسجلة

1 حصص مباشرة

2 حصص مسجلة

3 دورات مكثفة

أحصل على بطاقة الإشتراك





- مقارنة النتائج التجريبية: من خلال المقارنة نلاحظ أنه بعد ضرب عظمة الرضفة (تنبيه العضلة الباسطة للساق) ارتفع تواتر كمونات العمل في كل من العصبون الحسي و الحركي للعضلة الباسطة للساق بالإضافة إلى العصبون الجامع، بالمقابل انخفض تواتر كمونات العمل في **العصبون الحركي** للعضلة القابضة للساق، دليل على انتقال السيالة العصبية من العصبون الحسي إلى العصبون الجامع و العصبون

الحركي للعضلة الباسطة للساق، و **عدم انتقال** السيالة العصبية من العصبون الجامع إلى العضلة القابضة للساق.  
- الاستنتاج:

- \* يؤدي تمديد العضلة الباسطة إلى تنبيه عصبونها المحرك و تثبيط العصبون المحرك للعضلة المضادة لها (العضلة القابضة).
- \* نوع المشبك بين العصبون الحسي و العصبون المحرك للعضلة الباسطة هو **مشبك منبه** بينما نوع المشبك بين العصبون الجامع و العصبون المحرك للعضلة القابضة هو **مشبك مثبط** إذن دور العصبون الجامع هو تثبيط مرور السيالة العصبية.
- \* العمل المتضاد للعضلات الباسطة و القابضة مصدره تنوع المشابك (مشابك منبهة و مشابك مثبطة).

#### 4- معلومات هامة:

- تتميز المشابك بالنوعية فبعضها مشابك تنبيهية و الأخرى تثبيطية.
- نوع الوسيط الكيميائي المفرز من طرف الخلية قبل المشبكية هو الذي يحدد نوع المشبك.
- في المشبك التنبيهي يتم افراز وسيط كيميائي تنبيهي مثل الأسيتيل كولين و الذي يولد كمون بعد مشبكي تنبيهي (PPSE)، هذا الأخير إذا كانت سعته تساوي أو تفوق عتبة زوال الاستقطاب يتولد كمون عمل بعد مشبكي الذي ينتشر في الخلية بعد المشبكية، أما إذا كانت سعته أقل من عتبة زوال الاستقطاب فيزول و تبقى الخلية بعد المشبكية في حالة راحة.
- في المشبك التثبيطي يتم افراز وسيط كيميائي تثبيطي مثل الغابا و الذي يولد كمون بعد مشبكي تثبيطي (PPSI)، هذا الأخير عبارة عن فرط استقطاب.

GABA

## الخلاصة

- يتم انتقال الرسالة العصبية على مستوى المشبك باستعمال الوسائط العصبية، و التي تتمثل في مواد كيميائية تفرزها النهايات العصبية القبل المشبكية و تؤدي إلى زوال استقطاب غشاء البعد المشبكي.  
- تشفر الرسالة العصبية على مستوى المشبك بطريقتين، حيث يكون التشفير على مستوى الغشاء القبل المشبكي بتواترات كمونات عمل بينما على مستوى الشق المشبكي يكون تشفير تلك الرسالة بتركيز الوسيط الكيميائي.  
- الرسائل العصبية الناتجة عن شد المغازل العصبية العضلية تتسبب في تغيرات المقوية العضلية للعضلات الباسطة و القابضة برفع تواتر كمونات العمل للعصبونات المحركة للعضلة المشدودة و انخفاض (أو حتى انعدام) تواتر كمونات العمل للعصبونات المحركة للعضلة المضادة و ذلك بفضل تدخل عمل المشبك.

التعليمة: اشرح آلية انتقال السيالة العصبية على مستوى المشبك.

## التقويم

1 حصص مباشرة

2 حصص مسجلة

3 دورات مكثفة

أحصل على بطاقة الإشتراك









ملف الحصة المباشرة و المسجلة

1 حصص مباشرة

2 حصص مسجلة

3 دورات مكثفة

أحصل على بطاقة الإشتراك



PPSE  
مستقبل مشبكي

PPST  
مستقبل مشبكي

## وضعية الانطلاق:

### ماذا يحدث عند تنبيه المغزل العصبي العضلي لعضلة ما؟

- تنبيه المغزل العصبي العضلي لعضلة ما يؤدي إلى تقلصها لا إراديا (منعكس عضلي) بعد وصول رسالة عصبية حركية عبر العصبون الحركي، مما يؤدي إلى ثني أو بسط الطرف حسب نوع العضلة المنبهة (باسطة أو قابضة).

### هل يمكن القيام بحركات الثني و البسط للأطراف اراديا دون تنبيهه؟

- نعم، يمكن ذلك.

### ما هي المشكلة العلمية المطروحة من خلال النتائج المتوصل إليها سابقا؟

- ما هو تأثير التحكم الارادي على العصبون الحركي أثناء المنعكس العضلي؟

### اقترح فرضيات تجيب على المشكل المطروح سابقا.

- ف1: تثبيط مرور السيالة العصبية في العصبون الحركي تؤدي إلى عدم حدوث المنعكس العضلي.
- ف2: زيادة مرور السيالة العصبية في العصبون الحركي تؤدي إلى تضخيم المنعكس العضلي.

دروسكم  
منصة التعليم الإلكتروني

ملف الحصة المباشرة و المسجلة

1 حصص مباشرة

2 حصص مسجلة

3 دورات مكثفة

أحصل على بطاقة الإشتراك






## التقصى

### 1- إظهار الخصائص الإدماجية للعصبون الحركي:

- تجربة: نقوم بقياس توتر العضلة الباسطة للقدم عند إحداث تنبيه فعال على مستواها (ظربة خاطفة بواسطة مطرقة مطاطية على مستوى الوتر الأخيلى)، حيث تكون في الحالة 1 العضلة القابضة للقدم مسترخية (التسجيل باللون الأخضر)، أما في الحالة 2 فتكون متقلصة (التسجيل باللون الأحمر). النتائج مسجلة في الوثيقة (1) ص 22.



التعليمية: حلل النتائج المسجلة في الوثيقة.

1 حصص مباشرة

2 حصص مسجلة

3 دورات مكثفة

أحصل على بطاقة الإشتراك



- تحليل نتائج الوثيقة (1) ص 22: تمثل الوثيقة تسجيلات للعضلة الباسطة للقدم حيث نلاحظ:

- الحالة 1: تم الحصول على كمون عمل أحادي الطور على مستوى

العضلة الباسطة للقدم دليل على حدوث منعكس عضلي (منعكس أخيلي).

- الحالة 2: تم الحصول على كمون راحة على مستوى العضلة الباسطة للقدم دليل على عدم حدوث منعكس عضلي (منعكس أخيلي) أي تم تثبيطه من طرف المراكز العصبية العليا

استنتاج: تؤثر المراكز العصبية العليا على المنعكسات العضلية، حيث يمكن أن تثبطها (تجعلها بطيئة أو منعدمة) عن طريق منع انتقال السيالة العصبية على مستوى العصبونات المحركة.

1 حصص مباشرة

2 حصص مسجلة

3 دورات مكثفة

أحصل على بطاقة الإشتراك



(2)- دور الأجسام الوترية الغولجية في تثبيط المنعكس العضلي:  
تحتوي أوتار العضلات الهيكلية على نهايات عصبية حسية تشكل بنيات خاصة تدعى  
الأجسام العصبية الوترية الغولجية، حيث تعمل على استرخاء العضلات عند تقلصها  
الشديد حفاظا على سلامتها (حمايتها من التمزق إذا كان شد العضلة كبير).  
تمثل الوثيقة التالية مسار انتقال السيالة العصبية أثناء المنعكس العضلي العكسي  
(المنعكس الوتري) و الناتج عن التنبيه الشديد للعضلة الباسطة للساق (منعكس رضفي  
قوي جدا).



الوثيقة (3) من الملحق

التعليمة: فسر كيف تقوم الاجسام الوترية الغولجية بتثبيط المنعكس العضلي.


1 حصص مباشرة

2 حصص مسجلة


3 دورات مكثفة

أحصل على بطاقة الإشتراك





تدخل العصبون الحركي motoneuron في معالجة الرسائل العصبية يمكن توضيحه تجريبيا : أجهزة التنبيه و التسجيل.



- يؤدي التنبيه القوي جدا للعضلة الباسطة للساق إلى تقلصها الشديد نتيجة التواتر المرتفع لكمونات العمل التي تنتقل عبر العصبون الحركي للعضلة الباسطة للساق.

- تتحسس الأجسام الوترية الغولجية الموجودة في وتر العضلة الباسطة للساق لتقلص العضلة الشديد فتتولد سيالة عصبية حسية على مستواها تنتقل عبر عصبون حسي إلى النخاع الشوكي، حيث تنفرع نهاية العصبية إلى جزئين:

\* - جزء متصل بعصبون جامع ينقل إليه رسالة عصبية حسية عبر مشك منبه، غير أن العصبون الجامع يثبط مرور السيالة العصبية إلى العصبون الحركي للعضلة المتقلصة (وجود مشبك مثبط) و هذا ما يؤدي إلى استرخاء العضلة المتقلصة.

\* - الجزء الثاني متصل بعصبون جامع آخر ينقل إليه رسالة عصبية حسية عبر مشك منبه، و يقوم هذا العصبون الجامع بتنبيه العصبون الحركي للعضلة القابضة للساق (وجود مشبك منبه) مما يؤدي إلى تقلص العضلة القابضة.

- و بالتالي يعود الطرف (الساق) إلى حالته الأصلية.

### الخلاصة

- يؤمن المركز النخاعي معالجة المعلومات المعقدة بدمج الرسائل الواردة من الدماغ (تؤدي معالجة الرسائل العصبية من قبل المركز العصبي النخاعي إلى تضخيم أو تثبيط



## التقويم

التعلیمة: أنجز مخطط تحصيلي يظهر الخصائص الإدماجية للعصبون الحركي أثناء المنعكس العضلي.

دروسكم  
منصة التعليم الإلكتروني

ملف الحصة المباشرة و المسجلة

1 حصص مباشرة


2 حصص مسجلة

3 دورات مكثفة

أحصل على بطاقة الإشتراك



- مخطط تحصيلي يظهر الخصائص الإدماجية للعصبون الحركي أثناء المنعكس العضلي:



1 حصص مباشرة

2 حصص مسجلة

3 دورات مكثفة

أحصل على بطاقة الإشتراك





1 حصص مباشرة

2 حصص مسجلة

3 دورات مكثفة

أحصل على بطاقة الإشتراك





1 حصص مباشرة

2 حصص مسجلة

3 دورات مكثفة

أحصل على بطاقة الإشتراك



1 حصص مباشرة

1

2 حصص مسجلة

2

3 دورات مكثفة

3

أحصل على بطاقة الإشتراك

